

🔊 **Oefening 53 / Dentalen en alveolaren: actief**

Luister naar het onderscheid tussen de dentalen en de alveolaren. Elk voorbeeld is twee keer te horen; zeg de voorbeelden na in de pauzes.

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| a. <i>táng</i> ‘zaal’         | <i>cáng</i> ‘verbergen’                     |
| b. <i>zǒng</i> ‘steeds’       | <i>dǒng</i> ‘begrijpen’                     |
| c. <i>zuì</i> ‘dronken’       | <i>suì</i> ‘jaar’                           |
| d. <i>dǎzuò</i> ‘mediteren’   | <i>dǎ cuò</i> ‘een verkeerd nummer draaien’ |
| e. <i>cāndìng</i> ‘redigeren’ | <i>sān dìng</i> ‘officiële graanquota’      |

🔊 **Oefening 54 / Dentalen en alveolaren: passief**

Luister naar de opnamen a tot en met j. Noteer de beginmedeklinkers die u hoort in de Pinyin-transcriptie; zie als voorbeeld oefening 44.

- |    |    |
|----|----|
| a. | f. |
| b. | g. |
| c. | h. |
| d. | i. |
| e. | j. |

### 3.7 Retroflexen

*Zh-*, *ch-*, *sh-* en *r-* zijn retroflexe beginmedeklinkers. Retroflex, letterlijk ‘teruggebogen’, betekent dat de tongpunt omhoog staat onder de tandkassen. De *zh-* is een ongeaspireerde affricaat; de *ch-* is de geaspireerde tegenhanger. Hoewel de Mandarijnse *sh-* net als de Nederlandse *sh* van *show* een stemloze fricatief is, heeft de retroflexe klank een duidelijk diepere ruistoon. De beginmedeklinker *r-* is de stemhebbende tegenhanger van de *sh-*. De slotklank *-r* wordt behandeld in § 4.10.



De retroflexe medeklinkers ontbreken in de niet-Mandarijnse Chinese talen en verdienen daarom de aandacht van tweetalige sprekers van deze talen en het Nederlands. Zie hiervoor vooral de oefeningen 57-60, 67-68 en 71-74.